

Divergentes o Convergentes Puntos de Vista en el Rejuvenecimiento del Tercio Superior de la Cara

Upper Third Facial Rejuvenation Divergent or Convergent Points of View



Pérez-Macías J.M.

Pérez-Macías Macías, J.M.*

Resumen

El propósito del presente trabajo es el de revisar los métodos disponibles para el rejuvenecimiento del tercio superior de la cara.

Consideramos si en realidad los métodos propuestos, divergen o convergen para el fin último, que es el restablecimiento de las estructuras de esta región.

Hemos revisado en los últimos 5 años 152 pacientes cuyas edades estaban comprendidas entre los 32 y los 65 años, sometidos a varios procedimientos combinados (lifting frontal, blefaroplastia, miectomías y miotomías de los músculos responsables del envejecimiento en esta área, lipoestructura y resurfacing mediante láser CO2).

Discutimos los planos de despegamiento: subgaleal en región fronto-occipital, y entre la fascia parieto-temporal y temporal en la zona parietal, preconizando: incisiones pequeñas, suspensión del colgajo temporal, miectomías y miotomías a través del abordaje palpebral superior para el área periorbitaria y miotomías del frontal a través de la incisión media sagital frontal.

Mediante todos estos métodos mini-invasivos y no endoscópicos corregimos: las arrugas de frente, entrecejo y patas de gallo, descenso ciliar e interciliar; complementándolos con las técnicas de lipoestructura y de resurfacing con láser CO2, en casos seleccionados.

Abstract

The purpose of this article is to review the treatments available for rejuvenation of the upper third of the face. We consider the different points of view, divergent or convergent, in rejuvenation treatments of the forehead and orbital region.

We have performed brow lift with minimal incisions in combination with other procedures in 152 patients (32 to 65 years old) during the last 5 years. We combine brow lift, blepharoplasty, myotomies and myectomies of the muscular forces to contribute to the correction of forehead wrinkling; forehead-orbital lipostructure completes rejuvenation of the upper third of the face.

We perform forehead lift in the subgaleal plane at the frontal area, up to the anterior portion of the occipital region and over the temple between the superficial fascia and deep temporal fascia by blunt dissection. Without endoscope. We prefer to suspend the temporal flap after good release around the lateral brow to maintain the results. Posterior scalp sliding, together with the associate maneuvers, allow to elevate the eyebrows and maintain them at the appropriate level. The myectomies of the Corrugator and Depressor supercillii muscles with the myotomies of the lateral-superior portion of the Orbicularis oculi and Procerus muscles are carried out through the transpalpebral approach. Frontalis muscle myotomy is performed through the longitudinal forehead midline incision.

We use the combination of brow ptosis, forehead wrinkling, corrugator furrows and loose skin by association of mini-incision surgeries, resurfacing CO2 laser and by lipostructure at this area.

Palabras clave Rejuvenecimiento facial. Arrugas cara. Ritidectomía frontal.

Código numérico 26

Recibido en redacción Septiembre 2001

Revisado. Aceptado para publicación Diciembre 2001

Key words Facial Rejuvenation. Facial wrinkles. Brow lift.

Numerical code 26

Received September 2001

Accepted after revision December 2001

* Cirujano Plástico.