

Colgajo Supramaleolar Lateral. Modificación de Valenti Aplicada a 14 Casos. Lateral Supramaleolar Flap. Valenti's Modification in 14 Cases.



Laredo Ortiz C.

Laredo Ortiz C*, Salvador Sanz J*, Novo Torres A**, Lorda Barraquer E***, Castelar E**, Bernabeu Abad T*, Molfo García R *

Resumen

Presentamos nuestra experiencia en la utilización del colgajo supramaleolar lateral, con pedículo fasciograsso, en una serie de 14 pacientes. Las principales indicaciones de este colgajo son aquellos defectos situados en el tercio inferior de la pierna, cara anterior del tobillo, maléolo medial, dorso del pie y tendón de Aquiles.

En cuanto a morbilidad y resultados, constituye para nosotros un colgajo de primera elección en estas pérdidas de sustancia.

Abstract

We present our experience in the usage of lateral supramaleolar flap, with fasciosubcutaneous pedicle in a serie of 14 patients. Losses of tissue situated on the lower third of the leg, anterior aspect of ankle, medial maleolo, dorsum of foot and Achilles tendon are the main indications of this flap.

This flap it is regarded as a first choice for us in these losses of tissue.

Palabras clave Colgajos neurocutáneos. Colgajo supramaleolar.

Código numérico 402124

Recibido en redacción Abril 2002

Revisado. Aceptado para publicación Febrero 2003

Key words Neurocutaneous flaps. Supramaleolar flap.

Numeral code 402124

Received April 2002

Accepted after revision February 2003

* Médico Adjunto
** Médico Residente
***Jefe de Sección