

Colgajo Músculo-Cutáneo de Recto Abdominal Transpélvico para la Reconstrucción Perineal

Transpelvic Rectus Abdominis Myocutaneous Flap for Perineal Reconstruction



Bastreri, O.J.

Bastreri O.J.*, Canessa Sorin C. **, Carriquiry Kayel C***.

Resumen

Habitualmente los defectos perineales tras realizar una amputación abdomino-perineal (AAP) para resección de un carcinoma de ano o recto son rellenados con mechas de gasa para su cicatrización por segunda intención.

Esta cicatrización es muy lenta y difícil, con períodos de entre 6 meses y 1 año, con supuración permanente y eventualmente episodios de infección sistémica con sépsis, causando una morbilidad importante, sobre todo si se realiza radioterapia preoperatoria.

Un método efectivo para lograr la cicatrización primaria después de una AAP, es el cierre de la brecha perineal con un colgajo músculo-cutáneo de recto abdominal a pedículo inferior (arteria epigástrica inferior) pasado transpélvicamente en el mismo acto operatorio.

Los autores presentan un caso de reconstrucción perineal con este procedimiento para reconstrucción tras resección de un carcinoma de ano, en un paciente joven en el cual se realizó radioterapia preoperatoria.

Abstract

Defects left after abdomino-perineal resection (APR) of rectal or anus cancers often are left open and packed, waiting for a delayed secondary healing.

Healing is slow and difficult, and usually takes between 6 months and a year, with risk of local infection or systemic sepsis, causing considerable morbidity to the patients.

This is particularly so, if preoperative radiotherapy has been administered.

An effective method of achieving a healed wound immediately following the APR is to transfer an inferiorly-based (deep inferior epigastric vessels) rectus abdominis myocutaneous flap to the perineum through the pelvis.

The authors presents a case of perineal reconstruction with this procedure after anus carcinoma resection in a young patient who received preoperative radiotherapy.

Palabras clave Colgajo Músculo-Cutáneo de Recto Abdominal Transpélvico. Reconstrucción Perineal.

Código numérico 551-158332

Recibido en redacción Diciembre 2001

Revisado. Aceptado para publicación Diciembre 2002

Key words Transpelvic Rectus Abdominis Myocutaneous Flap. Perineal Reconstruction.

Numerical code 551-158332

Received December 2001

Accepted after revision December 2002

* Asistente, Catedrático de Cirugía Plástica y Quemados.

** Prof. Adjunto, Clínica Quirúrgica A

*** Prof. Agregado, Catedrático de Cirugía Plástica y Quemados.